

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 724 DE 25 DE MAIO DE 2018

“Instituí a normatização para a prescrição de medicamentos, solicitação de exames complementares, de rotina, segmento e rastreamento, por profissionais de enfermagem no Município de Altaneira, Estado do Ceará, e adota outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Instituí, no âmbito da esfera da Secretaria Municipal de Saúde, a normatização da prescrição de medicamentos, solicitação de exames complementares, de rotina, segmento e rastreamento, pelos Enfermeiros integrantes da Rede de Saúde Pública do Município de Altaneira – CE;

Parágrafo único. O direito conferido ao enfermeiro não constituirá óbice a que o médico possa também fazer as prescrições subsequentes.

Art. 2º. O Enfermeiro poderá fazer prescrições de medicamentos, de modo que a prescrição prevista no artigo anterior se refira somente a medicamentos previamente estabelecidos em Programas de Saúde Pública do Ministério da Saúde, Conselho Federal e Regional de Enfermagem, respectivamente COFEN e COREN, e em rotinas aprovadas pela Secretaria de Saúde do Município de Altaneira nos termos do Anexo I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo único. A prescrição de medicamentos para doenças crônicas, hipertensão e diabetes, será, obrigatoriamente, subsequente à prescrição médica com reavaliação a cada 03 (três) meses.

Art. 3º. O Enfermeiro poderá solicitar exames complementares, de rotina, de rastreamento e de seguimentos do paciente, desde que enquadrados nos Programas de Saúde Pública do Ministério da Saúde e em rotinas aprovadas pela Secretaria de Saúde do Município de Altaneira, conforme disposto no Anexo II parte integrante desta Lei.

Art. 4º. A prescrição de medicamentos e a solicitação de exames pelo Enfermeiro deverão ser em receituário padronizado da Secretaria de Saúde do Município de Altaneira, ou em formulário com o carimbo da Unidade Básica de Saúde, datado e identificado com carimbo contendo número da inscrição no Conselho de Enfermagem – COREN-CE, nome do profissional e respectiva assinatura/rubrica.

Art. 5º. São programas de saúde pública do Ministério da Saúde e/ou adotados pela Secretaria Municipal de Saúde de Altaneira:

- I - Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança;
- II - Programa de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes;
- III - Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher;
- IV - Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto;
- V - Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso;
- VI - Programa de Diabetes Mellitus;
- VII - Programa de Hipertensão Arterial;
- VIII - Programa de Controle da Tuberculose;
- IX - Programa de Controle da Hanseníase;
- X - Programa de Controle da Leishmaniose Tegumentar Americana;
- XI - Programa de Assistência às Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais;
- XII - Programa de Controle do Tracoma;
- XIII - Programa de Combate à Dengue;
- XIV - Rotina de tratamento de feridas;
- XV - Programa Nacional de Suplementação de Ferro;
- XVI - Programa de Combate a Asma;
- XVII - Programa de Prevenção e Atendimento às Vítimas de Acidentes e Violências;
- XVIII - Programa de Cessação do Tabagismo.

§ 1º Na falta de protocolos vigentes para os referidos programas, ainda não elaborados pela Secretária Municipal de Saúde, serão adotados os protocolos do Ministério da Saúde.

Art. 6º. Esta Lei não isenta nenhum Enfermeiro de sua responsabilidade ético-legal durante seu desempenho pessoal no exercício de sua profissão, podendo o profissional, recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal, estando amparado pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

Art. 7º. Esta Lei e Anexos deverão ser revisados e atualizados anualmente e/ou sempre que for necessário a partir da data da sua publicação.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, em 25 de maio de 2018.

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
Prefeito Municipal

ANEXO I DA LEI 724/2018

RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA E ROTINA, E APROVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTANEIRA - CE

ANTIVIRAIS, ANTIBIÓTICOS, ANTIPARASITÁRIOS E ANTIFÚNGICOS

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER

AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO				
INDICAÇÃO	POSOLOGIA	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	CONTRAINDICAÇÃO	PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS
Macrolídeo; Antimicrobiano	Adultos: 500mg, VO, 1 vez ao dia. Dose máxima: 1g Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi ou Neisseria gonorrhoeae: Dose usual: 1000mg, VO, em dose única.	O uso concomitante com digoxina pode aumentar a concentração de digoxina O uso concomitante com derivados de Ergo não é recomendado (ex. dihidroergotamina, mesilato ergoloide, ergonovina, ergotamina, metilergonovina, pimoziada	Após a reconstituição manter em temperatura ambiente por 5 dias. Não há dados quanto a sua segurança durante a amamentação e gestação.	Vômitos e diarreia ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES Pacientes com disfunção hepática significativa. Pacientes com intervalo de QT prolongado MONITORIZAÇÃO: Testes de função hepática
ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO				
Tratamento de Herpes simples em adultos Tratamento de Herpes zoster em adultos	Dose usual: 200mg, VO, 5 vezes ao dia (intervalos de aproximadamente 4 horas) durante 5 dias Dose usual: 800mg, VO, 5 vezes ao dia (intervalos de aproximadamente 4 horas) durante de 7 dias.	Micofenolato: Aciclovir pode aumentar a concentração sérica de Micofenolato e vice-versa; Tenofovir: Aciclovir pode aumentar a concentração sérica de Tenofovir; Vacina contra o Vírus da Varicela: O Aciclovir pode diminuir o efeito terapêutico da Vacina; Zidovudina: O Aciclovir pode aumentar o efeito depressor do SNC da Zidovudina; Vacina Zoster: Aciclovir pode diminuir o efeito terapêutico da Vacina Zoster.	Contraindicado a pacientes com conhecida hipersensibilidade ao aciclovir ou ao valaciclovir	Pacientes com insuficiência renal e idosos; Análise de urina, creatinina sérica e enzimas hepáticas
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO				
Antiparasitário	Adultos: 250 a 750mg, VO, a cada 6 ou 8 h	Álcool, Fenobarbital, Fenobarbital, Lítio, Ciclosporina, Colestiramina, Carbamazepina, Cimetidina	Hipersensibilidade; Gestantes (primeiro trimestre). Uso de disulfiram nas últimas 2 semanas; Uso de álcool ou produtos contendo propileno glicol durante a terapia ou dentro de 3 dias após a interrupção da terapia	PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS: Efeitos do SNC: meningite asséptica, encefalopatia, convulsões, e neuropatia óptica. MONITORIZAÇÃO: Observar pacientes idosos e pacientes com insuficiência hepática grave. Observar pacientes quanto ao surgimento de sintomas neurológicos
METRONIDAZOL 10% CREME VAGINAL				
Antiparasitário	Aplique 2 a 3 vezes por dia	Álcool, Fenobarbital, Fenobarbital, Lítio, Ciclosporina, Colestiramina, Carbamazepina, Cimetidina	Hipersensibilidade, contraindicado na pediátrica e para homens.	PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS: Efeitos do SNC: meningite asséptica, encefalopatia, convulsões, neuropatia periférica (incluindo dormência das extremidades e parestesia) e neuropatia óptica. MONITORIZAÇÃO: pacientes idosos e com insuficiência hepática grave. Observar pacientes quanto ao surgimento de sintomas neurológicos
MICONAZOL NITRATO 2% CREME DERMATOLOGICO & MICONAZOL NITRATO 2% CREME VAGINAL				
Antifúngico	Dose usual: quantidade suficiente para cobrir a área afetada, 3 vezes ao dia.	Não há relatos de interações significativas	Hipersensibilidade. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávida	Irritação local, prurido e sensação de ardor. Não há contraindicações para pacientes idosos.
FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO OU CAPSULA				
Antifúngico	Adultos: 150mg/dia, VO. Dose máxima: 400mg/dia, VO.	Contraindicado associação: cisaprida, terfenadina, eritromicina, rifampicina, Hidroclorotiazida, amitriptilina, nortriptilina, azitromicina, benzodiazepínicos, carbamazepina, losartana, fenitoína, prednisona.	Medicamento compatível com a amamentação, mas que durante a gestação, seu uso deve ser criterioso	Anafilaxia. PRECAUÇÕES: deve ser usado com cautela em pacientes com disfunção renal e hepática ou hepatotoxicidade prévia de algum derivado azol. Usar com cautela em pacientes com risco de arritmia. MONITORIZAÇÃO: testes periódicos de função renal (AST, ALT, fosfatase alcalina) e testes de função renal, potássio.

CUIDADO COM O QUEIMADO

SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA				
Antimicrobiano tópico	Aplicar 2 a 3 vezes sem excessos,	Potencializa os efeitos da fenilbutazona e	Casos de hipersensibilidade	Prurido, erupções, fômites

	conforme resposta terapêutica apresentada pelo paciente	reduz os efeitos dos anticoagulantes e anticonvulsivantes		sensibilidade, agranulocitose, hepatite e febre
--	---	---	--	---

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA

NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL				
Antifúngico Tópico	Adultos e crianças: 100.000 a 600.000UI, VO, 4 vezes/dia.	Não são conhecidas interações com outros medicamentos e/ou outras substâncias.	Compatível com a amamentação, e contraindicado na gestação	Hipersensibilidade e angioedema, incluindo edema facial. Em altas doses orais poderá apresentar diarreia, distúrbios gastrointestinais, náuseas e vômitos.
PERMETRINA 1% LOCAO & PERMETRINA 5% LOCAO				
Pirétróide 1% Loção Shampoo: Pediculose; 5% Loção Pele: scabiose (sarna);	Adulto: 30 ml Crianças de 6 – 12 anos: Até 15 mL de produto Crianças de 2 – 5 anos Até 7,5 mL de produto	Não há relatos de interações com o uso deste medicamento.	Medicamento contraindicado durante a gestação e amamentação, em caso de hipersensibilidade aos componentes do produto, e em Crianças menores de 2 anos, deve ser evitado.	Prurido, edema e eritema. parestesia e alterações na pele (eczema, vermelhidão, coceira, queimação, irritação, desconforto e dor)

PRENATAL

CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL & CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO OU CAPSULA				
Cefalosporina 1ª geração; Antimicrobiano	Adultos: 250 a 1000mg, VO, de 6/6h. Durante 7 a 14 dias. Dose máxima: 4g/dia	Metformina, Probenecida, Antagonistas da vitamina K (por exemplo, varfarina)	Medicamento requer cautela durante a amamentação e gestação. CONTRAINDICAÇÃO: Pacientes alérgicos às cefalosporinas	Agitação, tonturas, fadiga, alucinações, dor abdominal, diarreia, dispepsia, gastrite. MONITORIZAÇÃO: Hemograma, função hepática e renal e sinais de diarreia associado ao antibiótico. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Ter cautela com pacientes com história de doença gastrointestinal, particularmente colite.
NITROFURANTOINA 100 MG COMPRIMIDO OU CAPSULA				
Antimicrobiano – miscelânea	Adultos: 50-100mg, VO, de 6/6h Profilaxia: 50-100mg, VO, 1 vez ao dia	Vacina BCG, Vacina contra a cólera, Vacina Tifoidea, Norfloxacin, Espironolactona, Ácido fólico, Fluconazol	Hipersensibilidade. Medicamento compatível com a Gestação e Amamentação Ajuste Renal: CrCl < 60ml/min: contraindicado	Anemia hemolítica, Insuficiência renal, toxicidade hepática MONITORIZAÇÃO: Sinais de reação pulmonar; Sinais de dormência ou formigamento das extremidades; Testes periódicos de função hepática, Testes da função renal

ANTI-HIPERTENSIVOS, IC, ANTIARRÍTMICOS HEMATOPÉTICOS

ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO				
Analgésico, Antipirético, Anti-inflamatório não-hormonal;	Adultos e crianças > 30kg Dose usual: 500 a 1000mg, VO, 3 a 4 vezes ao dia.	Anticoagulantes, trombolíticos e outros inibidores da agregação plaquetária e a associação com outros AINEs, levam ao aumento do risco de sangramento gastrointestinal	Contraindicado para gestantes, e uso cauteloso durante a amamentação	Cuidado – idosos; Risco de sangramento
Antiagregante Plaquetário	Dose usual: 100mg/dia, VO.			
AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO				
Antiarrítmico	Adultos: 100 mg a 1600 mg, conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada pelo paciente.	Verapamil, diltiazem, laxativos, diuréticos, digoxina, a amiodarona aumenta as concentrações de substratos da CYP 2C9 tais como varfarina ou fenitoína. Fentanila. Estatinas: o risco de toxicidade muscular (ex.: rhabdomiólise) é aumentado quando associado a sinvastatina, atorvastatina e lovastatina;	Medicamento incompatível com a Gestação e Amamentação. Pacientes com bradicardia sinusal; Bloqueio sinoatrial; Doença do nó sinusal (risco de parada sinusal); Distúrbios severos de condução atrioventricular; Pacientes que fazem uso de associação com medicamentos que possam induzir torsade de pointes.	MONITORAMENTO: Pressão sanguínea, Frequência cardíaca (ECG) e ritmo durante a terapia; Sinais de letargia, Edema, Testes de função hepática, Eletrólitos e Tireoide
ANLÓDIPINO BESILATO 5 MG COMPRIMIDO				
Anti-hipertensivo, bloqueador do canal de cálcio	2,5 mg a 20 mg dose diária, conforme orientação médica e resposta terapêutica	Sinvastatina, cetoconazol, itraconazol, ritonavir, claritromicina, rifampicina, cimetidina, digoxina, varfarina	Medicamento incompatível com a Gestação e Amamentação Hipersensibilidade às diidropiridinas	MONITORAMENTO: Função hepática, cardíaca, dores de cabeça, tontura, sonolência, náusea, edema e fadiga.

	apresentada pelo paciente			
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO				
Antianginoso; Anti-hipertensivo	Adultos: 25 a 200mg, VO. Conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada pelo paciente	Betabloqueadores e bloqueadores do canal de cálcio, nifedipino, glicosídeos digitais, clonidina, ibuprofeno	Medicamento incompatível com a Gestação e Amamentação. Hipersensibilidade, Bradicardia; Choque cardiogênico; Hipotensão; Acidose metabólica; Distúrbios graves da circulação arterial periférica; Insuficiência cardíaca descompensada.	Cautela nos pacientes com bradiarritmia, doença vascular periférica, DPOC; Bloqueio cardíaco 1º grau; Asmáticos, Insuficiência cardíaca; Retirada da terapêutica concomitante com clonidina, pode mascarar sintomas de hipoglicemia, feocromocitoma não tratado. Evitar suspensão abrupta do medicamento. MONITORIZAÇÃO: ECG, frequência cardíaca, função renal, pressão arterial. Sinais e sintomas de insuficiência cardíaca.
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO & CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO				
Antiarrítmico; Anti-hipertensivo	Dose usual: iniciar com 3,125mg, VO, 2 vezes ao dia, por 2 semanas. Aumentar de forma progressiva. Dose máxima: 50mg. Conforme orientação médica e resposta terapêutica.	Evitar associação com outras drogas inotrópicas negativas e bradicardizantes.	Medicamento de uso cauteloso na Gestação e Amamentação. Hipotensão, Vertigem, fadiga, Hiperglicemia, aumento de peso, Diarreia, Fraqueza	PRECAUÇÕES: cautela em pacientes com insuficiência cardíaca e angina. Contraíndico no choque cardiogênico MONITORIZAÇÃO: frequência cardíaca, pressão arterial, ureia, creatinina, função hepática, glicemia, colesterol e triglicérides
ENALAPRIL MALEATO 10 MG COMPRIMIDO & ENALAPRIL MALEATO 20 MG COMPRIMIDO				
Anti-hipertensivo	Adultos: 2,5mg a 40mg/dia, VO. Conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada pelo paciente.	Administração com outro anti-hipertensivo pode causar efeito aditivo	Medicamento compatível com a Amamentação e contraíndico na Gestação, risco de teratogenicidade	PRECAUÇÕES: administrar com cautela em pacientes com insuficiência renal. REAÇÕES ADVERSAS: tosse seca. Síncope MONITORIZAÇÃO: creatinina e potássio após sua introdução.

ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO				
Anti-hipertensivo Diurético	Adultos: Dose usual: 25 a 100mg, VO, 1 vez ao dia. Conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada	Pode potencializar a ação de agentes anti-hipertensivos. É contraíndico o uso concomitante com eplerenom, trianterom.	Medicamento compatível com a Amamentação e contraíndico na Gestação, risco de teratogenicidade	Úlcera da pele, hipercalcemia (grave), acidose metabólica, hemorragia gástrica, gastrite, agranulocitose, lúpus eritematoso sistêmico, câncer de mama, causa e efeito não estabelecida. MONITORIZAÇÃO: potássio sérico e urinário. PRECAUÇÕES: Uso em idosos
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO				
Anti-hipertensivo Diurético	Adultos: Dose usual: 20 a 80mg, VO, fracionados A Critério Médico. Dose de manutenção: 20 a 120mg, VO. Dose máxima: 600mg/dia. Conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada	Associações desaconselhadas, requer avaliação risco benefício.	Medicamento sem informações quanto a compatibilidade com a Amamentação, mas é contraíndico na Gestação, risco de teratogenicidade, e na anúria.	Hipotensão arterial. Eritema multiforme, eczema, síndrome de Stevens-Johnson. Pancreatite, hepatite isquêmica. Agranulocitose, anemia aplástica (raras), anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia. Mefrite Intersticial. Ototoxicidade PRECAUÇÕES: pacientes com hiperglicemia, hipocalemia e hiponatremia severa. Seu uso crônico pode levar a um aumento de ácido úrico. MONITORIZAÇÃO: eletrólitos séricos, função renal. Em altas doses, monitorar audição.
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO				
Anti-hipertensivo Diurético	Adultos: Dose usual: 12,5 a 50mg, VO, 1 vez ao dia. Conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada	Contraíndico o uso concomitante com dofetilida. Evitar lítio.	Medicamento compatível com amamentação, devendo ser criterioso o uso na gestação e contraíndico no caso de anúria.	Arritmias cardíacas, Desordem hematopoiéticas, hepatotoxicidade, pancreatite, Edema pulmonar, Eczema, Síndrome de Stevens-Johnson, Lúpus eritematoso sistêmico, Necrólise epidérmica tóxica, hipocalemia. MONITORAR: potássio, eletrólitos séricos, ureia e creatinina
ISSOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO				
Anti-hipertensivo vaso dilatador coronariano	10 mg a 120 mg/dia conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada pelo paciente.	O uso com acetilcolina, anti-histaminicos ou anti-hipertensivos aumenta o efeito hipotensor ortostático; com simpaticomiméticos, pode ter reduzido o seu efeito antianginoso. Sildenafil leva a hipotensão grave, risco cardiopata.	Contraíndico na hipersensibilidade, nos casos de hipotensão arterial grave	PRECAUÇÕES: Cautela quando administrado a pacientes com glaucoma, idosos
LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO				
Anti-hipertensivo e Insuficiência Cardíaca Crônica	Dose usual: 12,5 a 100mg/dia, VO, 1 a 2 vezes ao dia. conforme orientação médica	Associação com AINES, reduzem o efeito anti-inflamatórios, medicamentos que	Medicamento sem informações quanto a compatibilidade com a Amamentação. Contraíndico na Gestação,	Dor torácica, Fadiga, Hipoglicemia, Diarreia, Infecção urinária, Anemia, Fraqueza, trombocitopenia, rabdomiólise, angioedema.

	e resposta terapêutica apresentada pelo paciente	reduzem a pressão sanguínea, eleva o risco de hipotensão.	ORIENTAÇÕES: alternativa quando da contraindicação para IECAs	PRECAUÇÕES: pacientes com insuficiência renal. MONITORIZAÇÃO: pressão arterial, frequência cardíaca, função renal, e eletrólitos
--	--	---	---	--

PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO

Anti-hipertensivo; Antiarritmico; Antianginoso	Adultos: 10 mg a 320mg/dia, VO. Conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada pelo paciente	Contraindicado o uso concomitante com tioridazina.	Medicamento compatível com a amamentação, mas contraindicado na Gestação	Eritema, síndrome de Stevens-Johnson. Asma, broncoespasmo, choque cardiogênico, bloqueio cardíaco, segundo e terceiro grau, bradicardia sinusal. MONITORIZAÇÃO: frequência cardíaca e pressão arterial.
--	---	--	--	---

METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO

Anti-hipertensivo	Adultos: 250mg a 2000 mg/dia, VO. Conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada pelo paciente	Lítio administrado concomitantemente a metildopa pode causar toxicidade por lítio.	Medicamento compatível com a amamentação, devendo o uso ser criterioso durante a gestação.	Insuficiência Cardíaca Congestiva, necrólise epidérmica tóxica, colite, pancreatite, parkinsonismo, sedação, depressão da medula óssea, transtorno hematopoético. PRECAUÇÕES: Ajuste renal necessário. MONITORIZAÇÃO: pressão arterial, hemograma, teste de Coombs direto: basal, em seguida, 6 e 12 meses após início da terapia. Função hepática: basal, periodicamente, especialmente durante as primeiras 6 a 12 semanas.
-------------------	---	--	--	---

VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO

Anticoagulante	Adultos 2,5 mg a 5 mg/dia, VO. Dose de manutenção: de acordo com o tempo de protrombina ou INR. Conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada pelo paciente	ANTÍDOTO: Fitomenadiona (Kanakion 10mg ap 1mL / Kanakion 2mg ap 0,2mL). Potencializa: etilestranol, amiodarona, AINES, amitriptilina/nortriptilina, cloranfenicol, cimetidina, ciprofloxacino, eritromicina, fluconazol, glucagon, metronidazol, miconazol, salicilatos.	Medicamento compatível com a amamentação, mas contraindicado na Gestação. Aborto, eclampsia, Aneurismas; cerebral. Endocardite bacteriana. Tendências hemorrágicas. Ulcerações gastrintestinais. Hipertensão maligna	Síndrome de embolia pelo colesterol, choque hemorrágico, emorragia, agranulocitose, hematoma retroperitoneal. Hepatite, Hemorragia. MONITORIZAÇÃO: Tempo de pró-trombina, hematócrito e INR.
----------------	---	--	--	--

ANTIDIABÉTICOS**GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO**

Hipoglicemiante	2,5 mg a 20 mg/dia, conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada pelo paciente.	Miconazol, Fenilbutazona, Álcool, Insulina, acarbose, Metformina, fluconazol, captopril, enalapril, sulfonamidas, claritromicina e AINES, Clorpromazina Glicocorticoides, salbutamol, varfarina, e com Sulfonilureias	Medicamento incompatível com a Gestação e Amamentação	MONITORAMENTO: Função hepática e renal
-----------------	--	---	---	--

GLICAZIDA MR 30 MG COMPRIMIDO

Hipoglicemiante	Dose usual: 30 a 120mg, VO, em única tomada. Conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada pelo paciente	Miconazol, Fenilbutazona, Álcool, Insulina, acarbose, Metformina, fluconazol, captopril, enalapril, sulfonamidas, claritromicina e AINES, Clorpromazina Glicocorticoides, salbutamol, varfarina, e com Sulfonilureias	Medicamento sem informações quanto a compatibilidade com a Amamentação, mas é contraindicado na Gestação. Contraindicado para pacientes com diabetes tipo I (como única terapia).	PRECAUÇÕES: doença hepática, insuficiência renal (moderada à severa), períodos de stress (ex: infecção, trauma, febre, cirurgia) insulina pode ser necessária.
-----------------	--	---	---	--

METFORMINA CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO

Hipoglicemiante	500 mg a 2000 mg/dia, conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada pelo paciente	Glicocorticoides, Diuréticos, Verapamil, Rifampicina, Cimetidina, Álcool.	Medicamento contraindicado para menores de 17 anos, durante a gestação e amamentação. Na acidose metabólica, Insuficiência cardíaca e Hepática, quando a Taxa de Filtração Glomerular for inferior a 30 ml/min.	Náusea, vômito, diarreia, dor abdominal e inapetência, Distúrbios do paladar, reações cutâneas como eritema, prurido e urticária, Anormalidades nos testes da função hepática ou hepatite. MONITORIZAÇÃO: Hematológica; Urina para glicose e cetonas, glicemia em jejum, hemoglobina A1c; Função renal. Vitamina B12 e Folato
-----------------	---	---	---	---

ANTI-INFLAMATORISMO NÃO ESTEROIDAIIS - AINES**DIPIRONA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL & DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO**

Analgésico, Antipirético, Anti-inflamatório	Adultos e Crianças > 12 anos: Dose usual: 500 a 750mg (20 a 30 gotas), VO, 1 a 4 vezes ao dia. Crianças: Dose usual: 20 a 25mg/kg/dose, VO, de 6/6h. Dose máxima: 500mg. Neonatos: Dose usual: 10mg/kg/dose, VO, em intervalos de 6/6h.	Não administrar concomitantemente com ciclosporina.	PRECAUÇÕES: história de ulceração gastrointestinal, sangramento e perfuração. Disfunção hepática e renal.	MONITORIZAÇÃO: temperatura e frequência cardíaca. Pressão arterial e frequência cardíaca, particularmente com administração parentera
---	---	---	---	---

IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL & IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO

Analgésico, Antipirético, Anti-inflamatório não-hormonal	Adultos: Dose usual: 200 a 800mg/dose, VO. Dose máxima: 3200mg/dia, VO. Crianças: Dose usual: 5 a 10mg/Kg, VO, 3 a 4 vezes ao dia. Dose máxima:	Uso concomitantemente com medicamentos à base de cortisona aumenta o risco de úlceras gástricas. O ibuprofeno em	PRECAUÇÕES: usar com cautela em pacientes com hipertensão, desidratação, redução da função renal e hepática, história de doença GI.	Contraindicada para pacientes com hipersensibilidade; compatível com amamentação e contraindicado na gestação
--	---	--	---	---

	40mg/kg/dia, VO. Crianças > 30kg. Dose máxima: 1200mg/dia, VO.	associação com furosemida e tiazídicos diminui o efeito diurético dessas drogas.		
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL & PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO				
Analgésico, Antipirético, Anti-inflamatório não-hormonal	Adultos: Dose usual: 500mg, VO, em intervalos de até 4h, se necessário. Dose máxima: 3g/dia. Crianças: Dose usual: 10 a 15mg/kg, VO, em intervalos de 4 a 6h. Dose máxima: 5 doses/dia. Neonatos: Dose de ataque: 24mg/kg, VO. Dose de manutenção: 12mg/kg/dose, VO.	Associado a bebidas alcoólicas há elevação do risco de hepatotoxicidade ANTÍDOTO: Acetilcisteína (Fluimucil 600mg cp. eferv ou Fluimucil 10% ap. 3mL)	Pacientes com deficiência de G6PD. Gastrointestinal: hemorragia gastrointestinal Hepática: hepatotoxicidade Renal: nefrototoxicidade Respiratória: pneumonite.	ALERTA: ANTÍDOTO: Acetilcisteína (Fluimucil 600mg cp. eferv ou Fluimucil 10% ap. 3 mL); PRECAUÇÕES: Não exceder 5 doses em 24hs. Tratamento da superdosagem com N-acetilcisteína. MONITORAMENTO Testes da função hepática, em pacientes medicados com doses elevadas ou pré-disposição a toxicidade hepática.

ANTI-EMETICOS E ANTI-SECRETORES

METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUCAO ORAL				
Antiemético, Procinético	Adultos: Dose usual: 10mg, VO, 3 vezes ao dia, administrados 30min antes das refeições.	Combinação contraindicada: levodopa ou agonistas dopaminérgicos e metoclopramida possuem ações contrárias. Combinações a serem evitadas: álcool aumenta o efeito calmante da metoclopramida	>10%: Agitação, vertigem, sintomas extrapiramidais, Diarreia, Fraqueza SÉRIAS: Arritmia cardíaca, reversível, Síndrome neuroléptica maligna	MONITORIZAÇÃO: pressão arterial. PRECAUÇÕES: usar com cautela em pacientes com doença de Parkinson ou convulsão.
OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA				
Redutor da acidez gástrica	Adultos: Úlcera gástrica duodenal: Dose usual: 20mg, VO, 1 vez ao dia.	O omeprazol inibe metabolismo dos fármacos que dependem do citocromo P-450, monooxigenase hepática. Nesses casos, recomenda-se a adequação das doses dos medicamentos	Gastrointestinais: pancreatite (rara); Hepática: hepatotoxicidade (rara); Musculosqueléticas: fratura do quadril, rabdmiólise; Renal: nefrite intersticial (rara)	Maior eficácia quando administrado em jejum. MONITORIZAÇÃO: dosar TGO e TGP se duração da terapia for maior que 8 semanas.
RANITIDINA CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO & RANITIDINA CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE				
Redutor da acidez gástrica	Adultos: 150mg, VO, 2 vezes ao dia. Dose profilática: 150mg, VO, 1 vez ao dia (ao deitar).	Diazepam, midazolam, lidocaina, fenitoína, propranolol, cetoconazol,	Medicamento compatível com a amamentação, e o uso criterioso durante a Gestação. Não existem contraindicações relativas a faixas etárias.	Gastrointestinais: enterocolite necrosante no feto ou recém-nascido, pancreatite (rara). Hematológica: anemia, trombocitopenia (rara).

VITAMINAS E SUBSTANCIAS MINERAIS

ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO				
Vitamina	Dose usual: 5mg, VO, 1 vez ao dia. Conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada pelo paciente	Fenitoína, fenobarbital, metotrexato e enzimas pancreáticas reduzem os seus níveis, enquanto que o ácido aminosalicílico, antiácidos, colestiramina, estrogênios, bloqueadores H2 e a carbamazepina reduzem sua absorção.	Contraindicado na anemia normocítica, perniciosa ou aplástica.	Imunológicas: alergia
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COMPRIMIDO				
Inibidor do catabolismo ósseo	Dose usual: 70mg, VO, 1 vez por semana.	Como o uso de AINEs está associado à irritação gastrointestinal, deve-se ter cuidado durante o uso concomitante	Reque uso cauteloso durante a amamentação, e deve ser evitado durante a gestação. Risco de extrema reação na pele, artralgia, dor óssea e mialgia.	ORIENTAÇÕES: deve ser tomado em jejum com muita água, na posição ortostática. MONITORIZAÇÃO: níveis séricos de cálcio, eletrólitos e níveis de fosfato.
CARBONATO DE CALCIO + COLICALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMP				
Suplemento mineral	Adultos: 1 ou 2 comprimidos mastigáveis ao dia, preferencialmente após as refeições.	Formulações contendo: ferro, etidronato, alendronato, fenitoína, tetraciclina, atenolol, propranolol, salicilatos, devem ocorrer com um intervalo de pelo menos 2-3 horas	Hipersensibilidade. Medicamento deve ter o uso criterioso durante a amamentação e ser evitado na gestação	Perturbações gastrointestinais leves, incluindo-se constipação. Monitorar Cálcio Sérico RN.
OLEO MINERAL LIQUIDO				
Laxante	Adulto: ½ a Uma colher de sopa ao deitar-se.	Não foram identificadas interações medicamentosas clinicamente relativas.	Uso criterioso durante a amamentação e gestação, em idosos e crianças	Hipersensibilidade
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G PO PARA SOLUCAO ORAL				
Reidratante oral, repositor de água e eletrólitos	Dissolva o conteúdo da embalagem em 500 ml de água, e o consuma em até 24 horas	Picos de hipertensão em pacientes em uso de digoxina	Contraindicado na obstrução intestinal, perfuração do intestino, ou vômitos frequentes e ininterruptos	Não se observam eventos adversos.
SULFATO FERROSO 25 MG/ML FE²⁺ + SOLUCAO ORAL & SULFATO FERROSO 40 MG FE²⁺ COMPRIMIDO				
Suplementação de Ferro em Crianças e Gestantes	Conforme orientação médica e resposta terapêutica apresentada pelo paciente. Seguindo Protocolo de Suplementação de Ferro em Crianças e Gestantes	A ingestão de álcool, causando incremento do depósito hepático de ferro, aumenta a probabilidade de efeitos colaterais e até tóxicos do ferro, quando em uso prolongado.	Hipersensibilidade aos sais de ferro; Anemias associadas a leucemias e hepatopatia aguda. Anemias não ferropriva; Talassemia; Processos que	Gastrointestinal: sensação de plenitude, dores epigástricas, náuseas, constipação ou diarreia. O possível escurecimento das fezes, não tendo significado clínico.

			impedem a absorção do ferro por via oral, como diarreia crônica, retocolite ulcerativa, artrite reumatóide, doença de Crohn e asma brônquica	MONITORAMENTO Exames hematológicos, função hepática
--	--	--	--	--

HIPOLIPEMIANTES

SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO				
Hipolipidêmico	Adultos: 5 a 80mg/dia VO Crianças (< de 10 anos): 5mg/dia, se tolerar 10mg após 4 semanas. Crianças (> de 10 anos): 10mg/dia, se tolerar 20mg após 4 semanas.	Inibidores potentes de CYP3A4: itraconazol, cetoconazol, eritromicina, claritromicina, boceprevir, telaprevir, nefazodona. Genfibrozila, ciclosporina ou danazol. Verapamil.	Medicamento compatível com a amamentação, mas contraindicado na Gestação. Uso criterioso em crianças.	MONITORIZAÇÃO: enzimas hepáticas. Mialgia - pode causar rhabdomiólise. Deve ser administrado à noite, preferencialmente.

ANTIALERGICOS / ANTIASMÁTICOS / CORTICOIDES

DEXAMETASONA 0,1% CREME DERMATOLOGICO				
Anti-inflamatório hormonal	Aplique 2 a 3 vezes por dia	Desconhecem-se interações medicamentosas prejudiciais com o uso de acetato de dexametasona creme dermatológico.	Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação mé	Não há restrições ou recomendações especiais para idosos

LORATADINA 1 MG/ML XAROPE & LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO

Antialérgico	Adultos: Dose usual: 10mg/dia, VO. Crianças > de 2 anos: Dose usual: 5mg/dia, VO. Crianças > de 6 anos: Dose usual: 10mg/dia, VO.	Aumenta as concentrações plasmáticas de Loratadina em uso associado com cetoconazol, eritromicina ou cimetidina	PRECAUÇÕES: ter cautela em pacientes com insuficiência renal e insuficiência hepática.	>10%: Cefaleia (12%); sonolência (8%) SÉRIAS:Hepática: diminuição da função hepática (rara).
--------------	--	---	--	---

PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL

Anti-inflamatório hormonal	Dose usual: 5 a 60mg/dia, VO, 1x dia. Esclerose múltipla: 200mg/dia, VO, por 1 semana, seguidos por 80mg, VO, em dias alternados por 1 mês.Artrite reumatoide: 5 a 7,5mg/dia, VO. Ajustar a dose conforme necessário.	Fenobarbital, fenitoína, rifampicina ou efedrina, diuréticos depletos de potássio, glicosídeos cardíacos, anfotericina B, anticoagulantes, somatotropina	Evitar uso durante na gestação e amamentação Aumento do apetite e indigestão, ulcera gástrica ou duodenal, com possível perfuração e sangramento, pancreatite e esofagite ulcerativa; Nervosismo, cansaço e insônia; Reação alérgica localizada; Alterações endócrinas: Pré-diabetes, ocorrência de diabetes em pessoas predispostas.	CONTRAINDICAÇÃO: Infecções não controladas e infecções sistêmicas por fungos; MONITORIZAÇÃO: Pressão arterial, glicemia, eletrólitos, peso, densidade mineral óssea, crescimento e desenvolvimento em crianças, supressão do eixo HPA (Hipotálamo-hipófise-adrenal); ORIENTAÇÕES: Pode ser necessário aumentar a dose de para a obtenção dos efeitos terapêuticos necessários. Administrar com alimentos para diminuir os efeitos gastrointestinais.
----------------------------	--	--	--	---

PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO & PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO

Anti-inflamatório hormonal	Adultos: 5 a 80mg/dia, VO, 1 vez ao dia, pela manhã.	Fenobarbital, fenitoína, rifampicina ou efedrina, diuréticos depletos de potássio, glicosídeos cardíacos, anfotericina B, anticoagulantes, somatotropina	Evitar uso durante na gestação e amamentação Aumento do apetite e indigestão, ulcera gástrica ou duodenal, com possível perfuração e sangramento, pancreatite e esofagite ulcerativa; Nervosismo, cansaço e insônia; Reação alérgica localizada; Alterações endócrinas: Pré-diabetes, ocorrência de diabetes em pessoas predispostas.	CONTRAINDICAÇÃO: Infecções não controladas e infecções sistêmicas por fungos; MONITORIZAÇÃO: Pressão arterial, glicemia, eletrólitos, peso, densidade mineral óssea, crescimento e desenvolvimento em crianças, supressão do eixo HPA (Hipotálamo-hipófise-adrenal); ORIENTAÇÕES: Pode ser necessário aumentar a dose de para a obtenção dos efeitos terapêuticos necessários. Administrar com alimentos para diminuir os efeitos gastrointestinais.
----------------------------	--	--	--	---

TABAGISMO

NICOTINA ADESIVOS TRANSDÉRMICOS 7 MG; 14 MG; 21 MG

Repositor de Nicotina	01 (Um) adesivo por 24 h. Não exceder essa dose.	Não foram identificadas interações medicamentosas clinicamente relativas. Entretanto a cessação do tabagismo e dos adesivos, requer possível ajuste nas dosagens dos medicamentos antialérgicos, cardiostimulantes e outros de ação no sistema nervo central.	Medicamento contra indicado durante a amamentação e gestação, não há restrições relacionado à faixa etária	Hipersensibilidade. Adolescentes de 12 – 17 anos, devem ser monitorados pelo médico
-----------------------	--	---	--	---

NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR

Repositor de Nicotina	01 (Um) Tablete, realizar mastigação intensa e ininterrupta com intervalos de 5 – minutos, até 6 ciclos. Masque até o aparecimento de um forte sabor ou uma leve sensação de formigamento, então pare a mastigação e coloque o tablete entre a bochecha e a gengiva até que o	Não foram identificadas interações medicamentosas clinicamente relativas. Entretanto a cessação do tabagismo e dos adesivos, requer possível ajuste nas dosagens dos medicamentos antialérgicos, cardiostimulantes e outros de ação no sistema nervo central.	Medicamento contra indicado durante a amamentação e gestação, não há restrições relacionado à faixa etária	Hipersensibilidade. Adolescentes de 12 – 17 anos, devem ser monitorados pelo médico
-----------------------	---	---	--	---

sabor ou o fornigamento tenha desaparecido. Volte a mastigar lentamente e repetindo o processo.			
ANAMNESE			
1. Você fuma? Há quanto tempo?			
2. Quantos cigarros fuma por dia?			
3. Quanto tempo após acordar acende o 1º cigarro?			
4. O que você acha de marcar uma data para deixar de fumar? Quando?			
5. Já tentou parar?			
6. O que aconteceu?			
TESTE DE FAGERSTRÖM			
1. Quanto tempo após acordar você fuma seu primeiro cigarro? Dentro de 5 minutos (3) Entre 6 e 30 minutos (2) Entre 31 e 60 minutos (1) Após 60 minutos (0)		4. Quantos cigarros você fuma por dia? Menos de 10 (0) _____ De 11 a 20 (1) _____ De 21 a 30 (2) _____ Mais de 31 (3) _____	
2. Você acha difícil não fumar em lugares proibidos, igrejas, bibliotecas? Sim (1) Não (0)		5. Você fuma mais frequentemente pela manhã? Sim (1) Não (0)	
3. Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação? O primeiro da manhã (1) Outros (0)		6. Você fuma, mesmo doente, quando precisa ficar de cama? Sim (1) Não (0)	
TRATAMENTO			
1. () Pacientes que fumam até 20 cigarros por dia e fumam seu 1º cigarro nos primeiros 30 minutos após acordar: GOMA DE MASCAR: EM FALTA • semana 1 a 4: 1 tablete a cada 1 a 2 horas • semana 5 a 8: 1 tablete a cada 2 a 4 horas • semana 9 a 12: 1 tablete a cada 4 a 8 horas		3. () Pacientes com escore do teste de Fagerström entre 8 a 10, e/ou fumante de mais de 20 cigarros por dia: ADESIVO DE NICOTINA: • semana 1 a 4: adesivo de 21 mg a cada 24 horas • semana 5 a 8: adesivo de 14 mg a cada 24 horas • semana 9 a 12: adesivo de 7 mg a cada 24 horas	
2. () Pacientes que fumam mais de 20 cigarros por dia: GOMA DE MASCAR: • semana 1 a 4: 1 tablete de 4 mg a cada 1 a 2 horas • semana 5 a 8: 1 tablete de 2 mg a cada 2 a 4 horas • semana 9 a 12: 1 tablete de 2 mg a cada 4 a 8 horas		4. () Pacientes com escore do teste de Fagerström entre 5 a 7, e/ou fumante de 10 a 20 cigarros por dia e fumam seu 1º cigarro nos primeiros 30 minutos após acordar: ADESIVO DE NICOTINA: • semana 1 a 4: adesivo de 14 mg a cada 24 horas • semana 5 a 8: adesivo de 7 mg a cada 24 horas	
5. () Bupropiona - Deve-se utilizar a seguinte dosagem, porém, em caso de intolerância, pode-se fazer ajuste posológico, a critério clínico: • 1 comprimido de 150 mg pela manhã por 3 dias, a partir d 4º dia 1 comprimido pela manhã e outro comprimido de 150 mg, 8 horas após, até completar 12 semanas.			

CONTRACEPTIVOS HORMONIOS SEXUAIS – SAÚDE REPRODUTIVA

LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO				
Contraceptivo Emergencial	1,5 mg dose única ou 0,75 mg 12/12h	Barbitúricos, fenitoína, rifampicina, determinados antibióticos penicilâmicos, cefalosporinas e tetraciclina (amoxicilina, ampicilina, oxacilina, penicilina, ácido clavulâmico, doxiciclina, eritromicina, Oxcarbazepina, carbamazepina, primidona, clobazam, e Antirretrovirais	Contraindicado em caso de sangramento genital, na suspeita da gravidez e durante a gestação	Náuseas, vômitos, risco de trombose venosa, quando associada a outros fatores predeterminantes, como genética, sedentarismo, tabagismo, diabetes e obesidade
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 MG + 0,03 MG COMPRIMIDO				
Contraceptivo Oral	Tomar um comprimido por dia por 21 dias consecutivos, seguido de um intervalo de 7 dias sem a ingestão de comprimidos	Barbitúricos, fenitoína, rifampicina, determinados antibióticos penicilâmicos, cefalosporinas e tetraciclina (amoxicilina, ampicilina, oxacilina, penicilina, ácido clavulâmico, doxiciclina, eritromicina, Oxcarbazepina, carbamazepina, primidona, clobazam, e Antirretrovirais	Medicamento incompatível com a Gestação e Amamentação antes do 28º do parto.	Contraindicado na ocorrência de trombose venosa profunda, história tromboembolismo, doença vascular cerebral ou arterial coronariana; na presença de carcinoma da mama, na Neoplasia hepática/doença hepática
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL				
Contraceptivo Trimestral	Administrar uma ampola, 150 mg/ml a cada 12 a 13 semanas	Barbitúricos, fenitoína, rifampicina, determinados antibióticos penicilâmicos, cefalosporinas e tetraciclina (amoxicilina, ampicilina, oxacilina, penicilina, ácido clavulâmico, doxiciclina, eritromicina, Oxcarbazepina, carbamazepina, primidona, clobazam, e Antirretrovirais	Medicamento incompatível com a Gestação, pacientes com sangramento vaginal, com histórico de eventos trombóticos. Durante a amamentação, aplicar a partir da 6ª semana, pós-parto	Retenção de líquidos, dor de cabeça, nervosismo, dor ou desconforto abdominal, sangramento uterino anormal, depressão, insônia, tontura, ondas de calor
ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG/ML + 5 MG/ML				

Contraceptivo Mensal	Administrar uma ampola, no mínimo 27 e no máximo 33 dias após a aplicação anterior	Barbitúricos, fenitoína, rifampicina, determinados antibióticos penicilâmicos, cefalosporinas e tetraciclina (amoxicilina, ampicilina, oxacilina, penicilina, ácido clavulâmico, doxiciclina, eritromicina, Oxcarbazepina, carbamazepina, primidona, clobazam, e Antirretrovirais	Medicamento incompatível com a Gestação. Presença ou história de processos trombóticos arteriais ou venosos, diabetes, doenças hepáticas	Retenção de líquidos, dor de cabeça, nervosismo, dor ou desconforto abdominal, sangramento uterino anormal, depressão, insônia, tontura, ondas de calor
NORETISTERONA 0,35 COMPRIMIDOS				
Contraceptivo Mine Pílula	1 comprimido ao dia, ininterruptamente, iniciando o tratamento a partir do primeiro dia da menstruação. E não deve ser interrompida durante o fluxo menstrual.	Este medicamento pode interromper a menstruação por períodos prolongados e/ou causar sangramentos intermenstruais severos	Tromboflebite, distúrbios tromboembólicos. Hepatopatia grave. Carcinoma de mama e neoplasia estrógeno. Sangramento genital anormal. Gravidez diagnosticada ou suspeita.	Metrorragia, Dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, amenorreia (ausência de menstruação), sensibilidade nas mamas, fadiga e aumento de peso.

ANEXO II DA LEI 724/2018

RELAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES, DE ROTINA, SEGMENTO E RASTREAMENTO A SEREM SOLICITADOS PELO ENFERMEIRO, CONFORME OS PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ADOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTANEIRA

PROGRAMAS	
Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança	Programa de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes
Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher	Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto
Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso	Programa de Hipertensão Arterial
Programa de Diabetes Mellitus	Programa de Controle da Tuberculose
Programa de Controle da Leishmaniose Tegumentar	Programa de Controle da Hanseníase
Programa de Assistência às Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais	Programa de Prevenção e Atendimento às Vítimas de Acidentes e Violências
Programa de Controle do Tracoma;	Programa Nacional de Suplementação de Ferro
Rotina de tratamento de feridas;	Programa de Combate à Dengue
Programa de Combate a Asma;	Programa de Cessação do Tabagismo
EXAMES	
Ácido Úrico;	Parasitológico de Fezes;
Anti HBS;	PAS Total e Livre
Anti HCV;	Potássio
Anti HIV;	Prova Tuberculina;
Baciloscopia - BAAR;	Rubéola IgG e IgM;
B-HCG;	Sódio;
Bilirrubina Total e Frações;	Sorologia para Dengue e Doenças Exantemáticas;
Citomegalovírus Humano IgG e IgM;	Sumário de Urina;
Citopatológico Cérvico - Vaginal;	Teste de Tolerância a Glicose – TTOG;
Colesterol Total e Frações;	Teste Rápido HIV, Sífilis, Hepatite B e C;
Coombs Indireto;	TGO;
Creatinina;	TGP;
Fator Rh (Fator D)	Tipagem Sanguínea;
Glicemia;	Toxoplasmose IgG e IgM;
HBSAg;	Triglicérides;
Hemoglobina Glicosada/Glicada;	Ureia;
Hemograma;	VDRL;

Publicado por:
Eduardo Gonçalves Amorim
Código Identificador: AC59FD3B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 28/05/2018. Edição 1952
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>